

Česká lékařská komora jednoznačně podporuje očkování

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

očkování patří mezi nejúčinnější nástroje prevence infekčních onemocnění a jejich závažných komplikací. **Česká lékařská komora proto jednoznačně podporuje očkování indikované lékařem a prováděné v souladu s odbornými doporučeními a individuálním zdravotním stavem pacienta.**

Před nadcházející sezónou respiračních infekcí bychom Vás chtěli požádat o aktivní zapojení do prevence chřipky, covid-19 a dalších očkováním preventabilních infekcí. Lékař má v rozhodování pacienta o očkování nezastupitelnou úlohu. Právě doporučení lékaře, který zná zdravotní stav svého pacienta, patří mezi nejvýznamnější faktory ovlivňující jeho rozhodnutí nechat se očkovat.

ČLK proto vyzývá své členy, aby očkování bylo běžnou součástí preventivní i léčebné péče a aby zejména u pacientů se zvýšeným rizikem závažného průběhu infekčních onemocnění byla potřeba očkování aktivně posouzena. Je-li očkování podle odborných doporučení indikováno, doporučujeme je pacientovi aktivně nabídnout a doporučit, případně zajistit jeho odeslání na pracoviště, kde může být očkování provedeno.

Aktuální odborná doporučení jsou dostupná na stránkách **České vakcinologické společnosti ČLS JEP (www.vakcinace.eu)**.

Očkování proti sezónní chřipce:

Česká vakcinologická společnost ČLS JEP doporučuje každoroční očkování proti chřipce všem osobám od 6 měsíců věku. Zvláštní význam má očkování zejména u:

- osob ve věku **50 let a více** a dětí ve věku **6 měsíců až 5 let**;
- osob s chronickými onemocněními plic a dýchacích cest, srdce a cév, neurologickými, renálními, jaterními nebo metabolickými onemocněními včetně diabetu, obezitou a poruchami imunity;
- těhotných žen v kterémkoli trimestru a žen plánujících těhotenství během chřipkové sezóny;
- zdravotnických pracovníků;
- klientů a zaměstnanců zařízení sociální a dlouhodobé péče;
- osob v blízkém kontaktu s lidmi se zvýšeným rizikem komplikovaného průběhu chřipky.

Očkování proti covid-19:

Sezónní očkování proti covid-19 je bez ohledu na počet dříve aplikovaných dávek doporučeno především:

- všem osobám ve věku **65 let a více**;
- osobám od 6 měsíců věku se závažným chronickým onemocněním, zejména plicním, kardiovaskulárním, renálním, jaterním, metabolickým či neurologickým onemocněním a osobám se závažnou obezitou;

- imunokompromitovaným osobám, včetně pacientů s aktivní onkologickou léčbou, po transplantacích, s významnými primárními imunodeficity, pokročilou nebo neléčenou infekcí HIV, anatomickou či funkční asplenií nebo při významné imunosupresivní léčbě;
- zdravotnickým pracovníkům;
- pracovníkům a klientům zařízení sociální péče.

U rizikových pacientů by tedy otázka očkování neměla zůstat pouze na jejich vlastní iniciativě. **Aktivní doporučení lékaře je důležitou součástí kvalitní preventivní péče.**

Cílem není pouze ochrana jednotlivce před infekcí, ale především **snížení rizika závažného průběhu, hospitalizace a dalších zdravotních komplikací**, a tím také omezení dopadu sezónních infekcí na zdravotní a sociální systém.

Česká lékařská komora děkuje všem lékařům, kteří se očkování a prevenci infekčních onemocnění dlouhodobě věnují, a žádá své členy, aby i v nadcházející sezóně věnovali této součásti péče o své pacienty náležitou pozornost.

V Praze dne 22.9.

Vědecká rada ČLK